ALGUNOS TABANOS NUEVOS PARA LA FAUNA ARGENTINA

(INSECTA-DIPTERA)

por SIXTO COSCARÓN

SUMMARY : **Some *Tabanídae* new for the Argentine fauna.(Insecta - *Diptera*)**

The following species, formerly unknown for the Argentine fauna, are mentioned with their geographic distributions : *Fidena longipalpis* Enderlein, *Fidena brachycephala* Kroeber, *Scaptia collaris* (Philippi), *Scaptia (Pseudoscione) latipalpis* (Macquart), *Acanthocera exstincta* (Wiedemann), *Chrysops trifascia* Macquart, *Chlorotabanus parviceps* Kroeber, *Pseudoacanthocera brevicorne* (Enderlein), *Pachyschelomyia notopleurale* Barretto, *Stenotabanus pallidicornis* Kroeber, *Stenotabanus obscurus* Kroeber, *Tabanus johannesi* Fairchild, *Tabanus mordax* Hine, *Tabanus quadripunctatus* Fabricius, *Tabanus rubrithorax* Macquart y *Tabanus trinotatus* Wiedemann.

Tratando de hacer una puesta al día de la fauna de tabánidos argentinos, que alcanza a 29 géneros, 179 especies y 3 subespecies, se ha encontrado material de 16 especies que no habían sido citadas anteriormente. Se excluyen aquí las correspondientes al género *Dasybasis* Macquart, del cual hay 9 especies que no figuraban en nuestro elenco, en razón de que ya está en prensa la revisión de este género en la región Neotropical y allí figurarán con mayor amplitud de datos.

Se contó para la realización de este trabajo con material del Museo de La Plata (M. L. P.) ; Museo Argentino de Ciencias Naturales (M. A. C. N.), Departamento de Entomología Sanitaria del Instituto Nacional de Microbiología (D. E. S.), Instituto Miguel Lillo (I. M. L.) y Colección A. Prosen.

Fidena longipalpis Enderlein

1925. *Fidena longipalpis* Enderlein, *Mitt. Mus. Berlin, 11* : 294.

MISIONES (sin loc.), I-1910, ♀ (M. L. P.). Estaba citada para Brasil (R. G. do Sul).

Fidena brachicephala Kroeber

1931. *Fidena brachicephala* Kroeber, *Zool. Anz., 95 :* 31.

MISIONES: San Ignacio, XII-1946, Col. Montes, 1 ♀ (M. L. P.). (Anteriormente Brasil.)

REV. SOC. ENT. ARG., Vol. XXVIII (1-4), pp. 57-59, Bs. As., 20 de octubre de 1966

Scaptia collaris (Philippi)

1865. *Pangonia collaris* Philippi, *Verh. zool. bot. Ges. Wien, 15 :* 709.

NEUQUÉN: Pucará, Parque Lanín, I-1954, Col. Schajovskoy, 1 ♀ (D. E. S.). (Anteriormente Chile).

Scaptia (Pseudoscione) latipalpis (Macquart)

1850. *Pangonia latipalpis* Macquart, *Dipt. Ex. Supp., 4 :* 25.

RÍO NEGRO: Bariloche, XI-1926, Col. Shannon, 1 ♀ (D. E. S.). (Anteriormente Chile.)

Acanthocera exstincta (Viedemann)-*

1828. *Haematopota exstinta* Wiedemann, *Auss. Zw. Ins., 1 :* 214.

CORRIENTES: Mercedes, XII-1941, 1 ♀ (M. L. P.). (Anter. Brasil y Uruguay.)

Chrysops trifascia Macquart

1838. *Chrysops trifascia* Macquart, *Dipt. Exot., 1 :* 159.

NEUQUÉN: Pucará, Parque Lanín, 1-1954, Col. Schajovskoy, 1 ♀ (Anteriormente Chile).

Chlorotabanus parviceps Kroeber

1930. *Chlorotabanus microcephalus* Kroeber, *Zool. Anz., 87 :* 17.
1934. *Chlorotabanus parviceps* Kroeber, *Rev. Ent., 4* (3) : 297.

ENTRE RÍOS: Concordia, 1 ♀ (I. M. L.). MISIONES: El Dorado, 1 ♀ (M. L. P.). (Anteriormente Brasil.)

Pseudoacanthocera brevicorne (Enderlein)

1925. *Pseudoselasoma brevicorne* Enderlein, *Mitt. Mus. Berlin, 11 :* 351.

SALTA: Vespucio, II-1946, 7 ♀ (M. L. P.). (Anter. Bolivia y Paraguay.)

Pachyschelomya notopleurale Barretto

1950. *Pachyschelomyia notopleurale* Barretto, *Anais Fac. Med. Univ. S. Paulo, 25 :* 93.

MISIONES: (sin loc.), 1-I-1911, 1 ♀ (M. L. P.). (Anteriormente Brasil).

* No tenemos seguridad de que esta especie se hubiera citado antes para la República Argentina, pues aunque Fairchild (comunicación personal) encontró en el Museo de Berlín esta especie etiquetada « La Plata Beschi » y clasificada por Wiedemann, debemos tener en cuenta que en esa época los autores alemanes citaban toda el área del Río de la Plata en ambas márgenes como « La Plata ».

Stenotabanus pallidicornis Kroeber

1929. *Stenotabanus pallidicornis* Kroeber, *Enc. Ent. Dipt., 5 :* 127.

TUCUMÁN: Río T. Viejo, 8-X-1942, Col. Del Ponte, 9 ♀ (D. E. S.) ; SALTA: Río Juramento, III-1961, 1 ♀ (D. E. S.) ; Yaguarenda, II-1960, 1 ♀; JUJUY: (sin loc.), 1 ♀ (D. E. S.). (Anteriormente Bolivia.)

Stenotabanus obscurus Kroeber

1929. *Stenotabanus obscurus* Kroeber, *Enc. Ent Dipt., 5 :* 124.

CATAMARCA: Concepción, 1 ♀ (M. A. C. N.). (Anteriormente Venezuela.)

Tabanus rubrithorax Macquart

1838. *Tabanus rubrithorax* Macquart, *Dipt. Ex., 1* (1) : 139.

MISIONES: (sin loc.), IX-1909, 1 ♀ (M. A. C. N.) ; SAN JUAN, XI-1937, 1 ♀ (M. L. P.) ; JUJUY: (sin loc.), I-1911, 1 ♀ (M. L. P.) ; SALTA: Vespucio, IX-1953 1 ♀ (M. A. C. N.). (Anteriormente Brasil.)

Tabanus mordax Hine

1920. *Tabanus mordax* Hine, *Ohio Journ. Sci., 10 :* 189.

FORMOSA: Herradura, IX-1936, Del Ponte col., 1 ♀ (D. E. S.) ; Laguna Blanca, IX-1956, Col. Del Ponte, 2 ♀ (D. E. S.) ; MISIONES: Apostoles, XII-1941, Col. Bezzi, 1 ♀ (M. L. P.) ; (sin loc.), I-1916, 1 ♀ (M. L. P.) ; BUENOS AIRES: Otamendi, XI-1955, 1 ♀ (D. E. S.). (Anteriormente Bolivia).

Tabanus johannesi Fairchild

1942. *Tabanus johannesi* Fairchild, *Ann. Ent. Soc. Am., 25 :* 164.

CHACO: Fontana, X-1935, Col. Daguerre, 1 ♂ (M. A. C. N.) ; Resistencia, 1936, Col. Daguerre, 1 ♀ (M. A. C. N.) ; Resistencia, XI-1958, Col. Prosen, 1 ♀; CÓRDOBA: Embalse, I-1965, 1 ♀ (D. E. S.). (Anteriormente Brasil).

Tabanus quadripunctatus Fabricius

1805. *Tabanus quadripunctatus* Fabricius, *Syst. Antl.* 99.

MISIONES: Puerto Iguazú, X-1954, Col. Orfila, 1 ♀ (M. A. C. N.) ; Caraguatay, 23-I-1960, 1 ♀ (D. E. S.) ; SALTA: (sin loc.), Col. Guzmán, 1 ♀ (M. A. C. N.) (Auteriormente Paraguay, Brasil, Uruguay).

Brèthes dio con dudas República Argentina, sin localidad, para su *Tabanus habilis*, que parece ser sinónimo de *T. quadripunctatus* Fabricius.

Tabanus trinotatus Wiedemann

1828. *Tabanus trinotatus* Wiedemann, *Auss. Zw. Ins., 1 :* 182.

FORMOSA: Ing. Juárez, III-1960, 1 ♀ (D. E. S.). (Anteriormente Brasil.)